レジメン名 mFOLFOX6+Cet250(2回目以降) q2w
コメント 大腸癌
標準適用日数 14日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
休薬完了	休薬完了														休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント 開通確認用							【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント 開通確認用						
		【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ) 1 V ボララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分													
									【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 ボラクミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 612 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分						
		【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アービタックス注(Cet) 250 mg/㎡ 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント Cet 250mg/㎡(2回目以降)⊕mFOLFOX6+Cet							【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アービタックス注(Cet) 250 mg/㎡ 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント Cet 250mg/㎡(2回目以降)⊕mFOLFOX6+Cet						
		【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 オキサリプラチン(L-OHP)点滴静注(5mg/mL) 85 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント レボホリナートと同時に L-OHP　85mg/㎡													
		【滴下順:3】 手技 中心静脈側管精密持続① 薬品 レボホリナート注(l-LV) 200 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 125 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント オキサリプラチンと同時に投与 l-LV200mg/㎡													
		【滴下順:4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 400 mg/㎡ 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント オキサリプラチン終了後全開で投与 5-FU　400mg/㎡													
		【滴下順:5】 手技 中心静脈(S)① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 2400 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 52 mL 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 2.173 ml/h 速度指示(時間) 注入時間46時間 注射コメント 輸液総量を100mLで自動計算 注射フリーコメント 5-FU 2400mg/㎡⊕mFOLFOX+Cet													
									【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス						
治療	抗がん剤処方	ナウゼリンOD錠10mg 3 錠 内服3回　朝・昼・夕食前 7 日分 化学療法初日夕方から内服開始													
			デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回　朝・昼食後 2 日分 化学療法2日目、3日目に内服												