**レジメン名** mFOLFOX6+Cet500 biweekly q2w
**コメント** 大腸癌
**標準適用日数** 14日

| 日付 | | 1病日 | 2病日 | 3病日 | 4病日 | 5病日 | 6病日 | 7病日 | 8病日 | 9病日 | 10病日 | 11病日 | 12病日 | 13病日 | 14病日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休薬完了 | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 注射 | 抗がん剤注射 | 【適下順：0】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 A<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間2分<br>注射フリーコメント 開通確認用 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【適下順：1】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶｻﾄﾞﾝ) 1 V<br>ボララミン注5mg／1mL 1 A<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 212 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間15分 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【適下順：2】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 アービタックス注(Cet) 500 mg/㎡<br>生理食塩液　500mL 400 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間2時間<br>注射フリーコメント 生食100mLを抜いて調製<br>Cet 500mg/㎡ @mFOLFOX6+Cet biweekly<br>※投与時間2回目90分、3回目以降60分まで短縮可 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【適下順：3】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 オキサリプラチン(L-OHP)点滴静注(5mg/mL) 85 mg/㎡<br>ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間2時間<br>注射フリーコメント レボホリナートと同時に投与<br>L-OHP　85mg/㎡　@mFOLFOX6+Cet biweekly | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【適下順：3】<br>手技 中心静脈側管精密持続①<br>薬品 レボホリナート注(l-LV) 200 mg/㎡<br>ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間2時間<br>注射フリーコメント オキサリプラチンと同時に投与。<br>l-LV200mg/㎡　@mFOLFOX6+Cet biweekly | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【適下順：4】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 400 mg/㎡<br>生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント オキサリプラチン終了後全開で投与。<br>5-FU　400mg/㎡　@mFOLFOX6+Cet biweekly | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【適下順：5】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 2400 mg/㎡<br>生理食塩液　100mL 52 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 2.173 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間46時間<br>注射コメント 輸液総量を100mLで自動計算<br>注射フリーコメント 5-FU 2400mg/㎡　@mFOLFOX6+Cet biweekly | | | | | | | | | | | | | |
| 治療 | 抗がん剤処方 | ナウゼリンOD錠10mg 3 錠<br>内服3回　朝・昼・夕食前 7 日分<br>化学療法初日夕方から内服開始 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | デカドロン錠0．5mg 8 錠<br>内服2回　朝・昼食後 2 日分<br>化学療法2日目、3日目に内服 | | | | | | | | | | | | |