レジメン名 Ram8＋nab-PTX100 q4w【アブラムシ】※DEX抜き
コメント 胃癌
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 ボララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 204 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分							【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント プライミング用							【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 ボララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 204 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分													
		【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サイラムザ点滴静注液(10mg/mL) 8 mg/kg 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント ★★フィルタ付ルートを使用★★ Ram 8mg/kg※Ram+nab-PTX														【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サイラムザ点滴静注液(10mg/mL) 8 mg/kg 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント ★★フィルタ付ルートを使用★★ Ram 8mg/kg※Ram+nab-PTX													
		【滴下順：3】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント RAM用リンス														【滴下順：3】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント RAM用リンス													
		【滴下順：4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント 満たし用														【滴下順：4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント 満たし用													
		【滴下順：5】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 アブラキサン注(nab-PTX) 100 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント Ram終了後より側管で投与 ★★フィルタ使用禁止★★ nab-PTX 100mg/m2 ※Ram+nab-PTX 薬液量：nab-PTX 5mg/mL 空の生食100mLバッグに薬液を注入する							【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 アブラキサン注(nab-PTX) 100 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント Ram終了後より側管で投与 ★★フィルタ使用禁止★★ nab-PTX 100mg/m2 ※Ram+nab-PTX 薬液量：nab-PTX 5mg/mL 空の生食100mLバッグに薬液を注入する							【滴下順：5】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 アブラキサン注(nab-PTX) 100 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント Ram終了後より側管で投与 ★★フィルタ使用禁止★★ nab-PTX 100mg/m2 ※Ram+nab-PTX 薬液量：nab-PTX 5mg/mL 空の生食100mLバッグに薬液を注入する													
		【滴下順：6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス							【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス							【滴下順：6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス													