レジメン名 S1+Bev7.5(大腸)q3w（内服有）
コメント 大腸癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント 血管確保用																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスチン注(Bev) 7.5 mg/kg 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、以降30分で投与可能 Bev 7.5mg/kg ＠S1+Bev																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス　全開で投与																				
治療	抗がん剤処方	ティーエスワン配合OD錠T20　80mg/㎡ 内服2回　朝・夕食後 14 日分 tri-weekly S1+Bev療法 S1　80mg/㎡ 2週間内服し1週間休薬 S1 体表面積初回基準量 1.25㎡未満　40mg/回、20mg 4錠 1.25㎡以上1.5㎡未満 50mg/回、25mg 4錠 1.5㎡以上　60mg/回、20mg 6錠																				
		ティーエスワン配合OD錠T25　80mg/㎡ 内服2回　朝・夕食後 14 日分 tri-weekly S1+Bev療法 S1　80mg/㎡ 2週間内服し1週間休薬 S1 体表面積初回基準量 1.25㎡未満　40mg/回、20mg 4錠 1.25㎡以上1.5㎡未満 50mg/回、25mg 4錠 1.5㎡以上　60mg/回、20mg 6錠																				