レジメン名 S1+Tmab8（胃・初回）q3w（内服有）
コメント 胃癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント 血管確保用																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 トラスツズマブBS点滴静注用(ﾊｰｾﾌﾁﾝ) 8 mg/kg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水 20mL 1 本 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント【初回または29日以上間隔開いた場合】 Tmab 8mg/kg（初回）@S1+Tmab 初回90分投与 150mgは注射用水7.2mLで、60mgは3mLで溶解（21mg/mL）																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス 全開で投与																				
治療	抗がん剤処方	ティーエスワン配合OD錠T20 80mg/㎡ 内服2回 朝・夕食後 14 日分 tri-weekly S1+HER療法 S1 80mg/㎡ 2週間内服し1週間休薬 S1 体表面積初回基準量 1.25㎡未満 40mg/回、20mg 4錠 1.25㎡以上1.5㎡未満 50mg/回、25mg 4錠 1.5㎡以上 60mg/回、20mg 6錠																				
		ティーエスワン配合OD錠T25 80mg/㎡ 内服2回 朝・夕食後 14 日分 tri-weekly S1+HER療法 S1 80mg/㎡ 2週間内服し1週間休薬 S1 体表面積初回基準量 1.25㎡未満 40mg/回、20mg 4錠 1.25㎡以上1.5㎡未満 50mg/回、25mg 4錠 1.5㎡以上 60mg/回、20mg 6錠																				