

レジメン名 SOX100+Tmab8 (胃・初回) q3w (内服有)
 コメント コモト 胃癌
 標準適用日数 21日

日付	1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日			
休薬完了	休薬完了																				休薬完了			
注射	抗がん剤注射	【滴下薬-1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アドキン点滴静注用(フグ)0.75mg 1袋 デキザール注射液6.6mg/2mL(フグ) 1V ホウライシ注5mg/1mL 1A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																						
		【滴下薬-2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 トラスツマブS8点滴静注用(r-7c7F) 8 mg/kg 医療従事者向けコメント 点滴漏れ保管 薬品 注射用水 20mL 1本 生理食塩液 250mL 1袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント 【初回または29日以上間隔開いた場合】 Tmab 8mg/kg (初回)@SOX+Tmab 初回90分投与 150mgは注射用水7.2mLで、60mgは3mLで溶解(21mg/mL)																						
		【滴下薬-3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 オキサリプラチン(L-OHP)点滴静注(5mg/mL) 100 mg/ml プドウ糖注 5% 500mL 1袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント L-OHP 100mg/ml@SOX+Tmab 【胃癌の場合はL-OHP 100mg/mlです！】																						
		【滴下薬-4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 50ml 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス 全期で投与																						
治療	抗がん剤処方	テーエスワン配合OD錠T20 80mg/ml 内服2回 朝・夕食後 14日分 bi-weekly SOX+HER療法 S1 80mg/ml 2週間内服し、週間休薬 S1 体表面積初回基準量 1.25㎡未満 40mg/回、20mg 4錠 1.25㎡以上 1.5㎡未満 50mg/回、25mg 4錠 1.5㎡以上 60mg/回、20mg 6錠																						
		テーエスワン配合OD錠T25 80mg/ml 内服2回 朝・夕食後 14日分 bi-weekly SOX+HER療法 S1 80mg/ml 2週間内服し、週間休薬 S1 体表面積初回基準量 1.25㎡未満 40mg/回、20mg 4錠 1.25㎡以上 1.5㎡未満 50mg/回、25mg 4錠 1.5㎡以上 60mg/回、20mg 6錠																						
		ナウゼリンOD錠10mg 3錠 内服3回 朝・昼・夕食前 7日分 化学療法初日夕方から内服開始																						
																						ナイトロン錠0.5mg 8錠 内服2回 朝・昼食後 2日分 化学療法2日目より3日目に内服		