レジメン名 SOX100＋Tmab6（胃・2回目以降）q3w（内服有）
コメント 胃癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順：1】 手技 持続点滴来棺メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 1 V ボララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 212 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分																				
		【適下順：2】 手技 持続点滴来棺メイン① 薬品 トラスツズマブBS点滴静注用(ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ) 6 mg/kg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水 20mL 1 本 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント 2回目以降投与時間30分まで短縮可 Tmab 6mg/kg(2回目以降)※SOX+Tmab 150mgは注射用水7.2mLで、60mgは3mLで溶解（21mg/mL）																				
		【適下順：3】 手技 持続点滴来棺メイン① 薬品 オキサリプラチン(L-OHP)点滴静注(5mg/mL) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間2時間 注射フリーコメント L-OHP 100mg/㎡※SOX＋Tmab 【胃癌の場合はL-OHP 100mg/㎡です！】																				
		【適下順：4】 手技 持続点滴来棺メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント リンス 全開で投与																				
治療	抗がん剤処方	ティーエスワン配合OD錠T20 80mg/㎡ 内服2回 朝・夕食後 14 日分 tri-weekly SOX+HER療法 S1 80mg/㎡ 2週間内服し1週間休薬 S1 体表面積初回基準量 1.25㎡未満 40mg/回、20mg 4錠 1.25㎡以上1.5㎡未満 50mg/回、25mg 4錠 1.5㎡以上 60mg/回、20mg 6錠																				
		ティーエスワン配合OD錠T25 80mg/㎡ 内服2回 朝・夕食後 14 日分 tri-weekly SOX+HER療法 S1 80mg/㎡ 2週間内服し1週間休薬 S1 体表面積初回基準量 1.25㎡未満 40mg/回、20mg 4錠 1.25㎡以上1.5㎡未満 50mg/回、25mg 4錠 1.5㎡以上 60mg/回、20mg 6錠																				
		ナウゼリンOD錠10mg 3 錠 内服3回 朝・昼・夕食前 7 日分 化学療法初日夕方から内服開始																				
			デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回 朝・昼食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																			