レジメン名 SP3(S 80+P 60) q3w
コメント 胃癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
当日確認	当日実施確認																					
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間	【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間	【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間																	
		【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ1) 1 本 フロセミド注20mg／2mL(ﾗｼｯｸｽ) 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 251 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間																			
		【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 シスプラチン注(CDDP) 60 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 300 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント 生食200mLを抜いて調製(遮光) CDDP 60mg/㎡投与@SP療法																			
		【適下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間																			
		【適下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液1L 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 64.5 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15時間30分																			
			【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝD) 1 本 メトクロプラミド注射液10mg/2mL(ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝD) 1 本 メトクロプラミド注射液10mg/2mL(ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間																	
			【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝD) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝD) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間																	
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1日分																			
		ティーエスワン配合OD錠T20 80mg/㎡ 内服2回 朝・夕食後 14 日分 SP療法(q3w) S1 80mg/㎡ day1-14 2週間内服、1週間休薬 S1 体表面積初回基準量 1.25㎡未満 40mg/回→4錠/day 1.25㎡～1.5㎡ 50mg/回→0錠/day(25mgで) 1.5㎡以上 60mg/回→6錠/day																			
		ティーエスワン配合OD錠T25 80mg/㎡ 内服2回 朝・夕食後 14 日分 SP療法(q3w) S1 80mg/㎡ day1-14 2週間内服、1週間休薬 S1 体表面積初回基準量 1.25㎡未満 40mg/回→4錠/day 1.25㎡～1.5㎡ 50mg/回→0錠/day(25mgで) 1.5㎡以上 60mg/回→6錠/day																			
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1cap 内服1回 朝食後 2日分																		
			デカドロン錠0．5mg 16錠 内服2回 朝・昼食後 2日分																		