レジメン名 TAS102_70+Bev 5 q4w
コメント 大腸癌
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント 血管確保用														【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント 血管確保用													
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスチン注(Bev) 5 mg/kg 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、以降30分で投与可能 Bev 5mg/kg day1,15@TAS102+Bev														【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスチン注(Bev) 5 mg/kg 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、以降30分で投与可能 Bev 5mg/kg day1,15@TAS102+Bev												
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス、全開で投与														【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス、全開で投与												
治療	抗がん剤処方	ロンサーフ配合錠T　70mg/㎡ 内服2回　朝・夕食後 5 日分 ※5日間内服して2日間休薬を2週間繰り返す TAS102_70mg/㎡@TAS102+Bev							ロンサーフ配合錠T　70mg/㎡ 内服2回　朝・夕食後 5 日分 ※5日間内服して2日間休薬を2週間繰り返す TAS102_70mg/㎡@TAS102+Bev																		