レジメン名 XP：Cape2000+P80 q3w
コメント 胃癌
標準適用目安 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾒﾄﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｷｻﾒﾄﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 212 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分																				
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾜﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間	【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾜﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間	【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾜﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間																	
		【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾜﾙﾃﾞﾑ1) 1 本 フロセミド注20mg／2mL(ﾗｼｯｸｽ) 1 A 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 251 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間																			
		【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 シスプラチン注(CDDP) 80 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 300 mL 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間2時間 注射フリーコメント 生食200mLを抜いて調製 【要遮光】 CDDP 80mg/㎡※XP療法																			
		【適下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾜﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間																			
		【適下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液1L 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 64.5 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15時間30分																			
			【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ﾋﾞｰﾝD) 1 本 メトクロプラミド注射液10mg/2mL(ﾌﾟﾘﾝﾍﾗﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ﾋﾞｰﾝD) 1 本 メトクロプラミド注射液10mg/2mL(ﾌﾟﾘﾝﾍﾗﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間																	
			【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ﾋﾞｰﾝD) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ﾋﾞｰﾝD) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間																	
治療	抗がん剤処方	般）アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																			
		般）カペシタビン錠300mg 2000mg/㎡/d 内服2回 朝・夕食後 14 日分 ※2週間内服し、1週間休薬する C法、2000mg/㎡/d、tri-weekly XP療法 Cape体表面積と投与量 1.36㎡未満 1回1200mg、4錠 1.36㎡以上1.66㎡未満、1回1500mg、5錠 1.66㎡以上1.96㎡未満 1回1800mg、6錠 1.96㎡以上 1回2100mg、7錠																			
			般）アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																	
			デカドロン錠0．5mg 16 錠 内服2回 朝・昼食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																	