レジメン名 XT：Cape2000＋Tmab8 q3w(初回)
コメント 胃癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント 血管確保用																				
		【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 トラスツズマブBS点滴静注用(ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ) 8 mg/kg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水　20mL 1 本 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間30分 注射フリーコメント Tmab 8mg/kg（初回）@XT療法 初回は90分で投与 150mgは注射用水7.2mLで、60mgは3mLで溶解（21mg/mL）																				
		【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス。全開で投与																				
治療	抗がん剤処方	般）カペシタビン錠300mg　2000mg/㎡/d 内服2回　朝・夕食後 14 日分 ※2週間内服し、1週間休薬する C法、2000mg/㎡/d、tri-weekly XT療法 Cape体表面積と投与量 1.36㎡未満　1回1200mg、4錠 1.36㎡以上1.66㎡未満、1回1500mg、5錠 1.66㎡以上1.96㎡未満　1回1800mg、6錠 1.96㎡以上　1回2100mg、7錠																				