# レジメン詳細

MENU　レジメン一覧

ID R0320　作成　完了

レジメン名 FOLFIRI180+AFL4 q2w

クールの日数 14日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
（day1のみ投与のレジメンは入力不要）　日間

催吐性リスク 中等度リスク　アルコール不耐症確認

投与回数制限
PDまで

| 薬品ID | 商品名 | 略号 | 用量 | 単位 | 希釈液 | 投与方法 | 時間（分） | | ⇒換算 | スケジュール day 1 | 2 | 3 | ～ | 14 | | | | | | | | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0083 | フルオロウラシル | 5-FU | 400 | mg/m² | 生食 50mL | 点滴 | 5 | min | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| 0083 | フルオロウラシル | 5-FU | 2400 | mg/m² | 生食計100mL | 持続 | 2760 | min | 46時間 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | |
| 0099 | レボホリナート | ℓ-LV | 200 | mg/m² | 5%TZ 250mL | 点滴 | 120 | min | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| 0014 | イリノテカン | CPT-11 | 180 | mg/m² | 5%TZ 250mL | 点滴 | 90 | min | 1.5時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| 0127 | ザルトラップ | AFL | 4 | mg/kg | 生食100mL | 点滴 | 60 | min | 1時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | |