レジメン詳細

MENU　レジメン一覧　ID R0590　作成 完了

レジメン名 TIP（PTX175+IFM1200+CDDP25） q3w

クールの日数 21日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
（day1のみ投与のレジメンは入力不要） 18日間

催吐性リスク 高度リスク　アルコール不耐症確認 必要

投与回数制限
陰茎癌に対する術前補助化学療法または進行再発患者

薬品ID	商品名	略号	用量	単位	希釈液	投与方法	時間（分）	⇒換算	day 1	2	3									補足
0073	パクリタキセル	PTX	175	mg/m²	5%TZ 500mL	点滴	180 min	3時間	↓											フィルタ使用
0013	イホマイド	IFM	1200	mg/m²	5%TZ 500mL	点滴	120 min	2時間	↓	↓	↓									
0051	シスプラチン	CDDP	25	mg/m²	生食250mL	点滴	60 min	1時間	↓	↓	↓									遮光投与
0117	ウロミテキサン	Mesna	240	mg/m²	生食 50mL	点滴	5 min	5分	↓	↓	↓									①IFM投与開始前
0117	ウロミテキサン	Mesna	240	mg/m²	生食 50mL	点滴	5 min	5分	↓	↓	↓									②IFM投与4時間後
0117	ウロミテキサン	Mesna	240	mg/m²	生食 50mL	点滴	5 min	5分	↓	↓	↓									③IFM投与8時間後
							min													