レジメン詳細

MENU　レジメン一覧

ID R0706　作成 完了

レジメン名 ENCO300+Cet500+mFOLFOX6　q2w

クールの日数 14日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
(day1のみ投与のレジメンは入力不要) 11日間

催吐性リスク 中等度リスク　アルコール不耐症確認

投与回数制限
BRAF(+)の進行再発大腸癌

薬品ID	商品名	略号	用量	単位	希釈液	投与方法	時間(分)		⇒換算	スケジュール day 1	2	3	8	～	14							補足
0083	フルオロウラシル	5-FU	400	mg/m²	生食 50mL	点滴	5	min	5分	↓												
0083	フルオロウラシル	5-FU	2400	mg/m²	生食計100mL	持続	2880	min	48時間	↓	↓	↓										
0099	レボホリナート	ℓ-LV	200	mg/m²	5%TZ 250mL	点滴	120	min	2時間	↓												
0022	オキサリプラチン	L-OHP	85	mg/m²	5%TZ 250mL	点滴	120	min	2時間	↓												
0008	アービタックス	Cet	500	mg/m²	生食250mL	点滴	120	min	2時間	↓												
0178	ビラフトビ	ENCO	300	mg/body				min		↓	↓	↓	↓	↓	↓							
								min														